

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos
Társaság
XXIV. kongresszusa

PROGRAMFÜZET



2004. október 14-16.

PECS

Dr Szűcs Adrienn

Sugó- Med Foglalkozásegészségügyi Központ ügyvezetője

A mozgásszervi megbetegedések megelőzése Viofor kezeléssel

A tapasztalatainkat tünetcsoportonként összesítettük, egyes esetekben fényképekkel és termovíziós felvételekkel illusztráljuk:

1. Mozgásszervi reumatikus jellegű panaszok

1.1 kezeléseket után panaszmentes-, jelentős javulás -, javulás-”értékelő beszámolás”.

2. Baleseti sérülések

2.1 többségük nyílt sérülés, másoknál zúzódás, törés, ficam, duzzanatok.

3 Perifériás érzékület

3.1 a kezeléseket hatására valamennyi esetben javulás következett be, az elzáródások okozta fájdalmak csökkentek, a keringés a kezelés előtti állapothoz viszonyítva kedvezően változott.

4 Allergia

kifejezetten allergia okozta panaszokkal is kezeltünk, a kezeléseket hatására további gyógyszerfogyasztás nélkül a panaszok megszűntek. Ezt saját magamon is tapasztaltam.

5 Egyéb esetek

további kezeléseket végeztünk:

1. stresszoldó hatás , - depresszió, - köszvény, - migrain, - ekzéma, - prostatitis
- diabetes panaszokkal jelentkező betegeken is.

Valamennyi esetben a kezelt személyek állapotuk javulásáról számoltak be.

6 Vérnyomás beállítása, magas ill.. alacsony vérnyomás kezelése

6.1 A kezeléseket során azt tapasztaltuk, hogy azok hatására a kezelt személyek túlnyomó többségénél (85 %) a vérnyomás optimális, vagy optimálisához közeli szintre került. Ez az állapot **jelentős gyógyszer-fogyasztás csökkentés** esetén is tartósan bizonyul.

7 Égési sérülések

7.1 Súlyosabb, a testfelület nagyobb hányadára kiterjedő égési sérült beteget nem kezeltünk, csak égés és forrázás okozta kisebb felhólyagosodott testrészeket.

8 Rehabilitáció, munkaképesség megőrzése

8.1 Kísérletsorozatot végeztünk a foglalkozással összefüggő mozgásszervi panaszok, a fizikai megterhelések hatására kialakult izomtúlterhelés, fájdalom enyhítésére, regenerálására.

8.2 Bebizonyosodott, hogy a készülékkel végzett kezelés hatására a munka befejezését követő 1 óra múlva a szervezet állapota csaknem teljes mértékben megközelítette a munka kezdés előtti állapotot.

A buszvezetőkön végzett megfigyelések eredménye képen el lehet kerülni a kifáradásos balesetek bekövetkezésének egy részét.